گل و گیاهان زینتی (۱٤۰۱)، ۷(۲) : ۲٦۱-۲۷٦
مقاله پژوهشی
DOI: 10.61186/flowerjournal.7.2.261

# ارزیابی نوع قلمه برگی، بستر کشت بدون خاک و ریزنمونه‌های برگ در تولید سانسوریای ابلق در شرایط درون/برون شیشه‌ای

**مصطفی خوشحال سرمست*، متین دولتی، مریم عباس آبادعربی، اسماعیل سیفی، مهدی علیزاده**

گروه علوم باغبانی و فضای سبز، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان

mkhsarmast@gau.ac.ir

تاریخ دریافت: ۱٤۰۱/٤/٦، تاریخ بازنگری: ۱٤۰۱/٥/۳۱، تاریخ پذیرش: ۱٤۰۱/٦/٤

**چکیده**

افزایش انبوه با حفظ ویژگی‌های ژنتیکی، هدف افزایش همگروهی گیاهان زینتی است. از میان گونه‌های زینتی، گیاهان بافت ناهمسان برای ظاهر جذاب، همیشه موردتوجه بوده‌اند. گیاه برگساره‌ای سانسوریا، به دلیل داشتن برگ‌های گوشتی و تحمل بیشتر به شرایط نامناسب محیطی، برای نگهداری در شرایط درون خانه بسیار مناسب است. افزایش همگروهی این گیاه با استفاده از نیساگ و پاگیاه صورت می‌گیرد. هدف از این پژوهش ارزیابی نوع قلمه برگ و آمیخته خاکی در باززایی گیاه ابلق در شرایط گلخانه و همچنین افزایش درون شیشه‌ای گیاهان ابلق سانسوریای پاکوتاه بود. نتایج آزمایش‌های انجام‌شده در گلخانه نشان‌دهنده این است که نوع قلمه برگ در انگیزش گیاه بافت ناهمسان بی‌تأثیر است. استفاده از بستر کوکوپیت به همراه پرلایت منجر به تولید تعداد ریشه بیشتر در گیاهان باززایی شده گردید اما با این‌وجود در مقایسه با بستر پرلایت تنها، تأثیری در بهبود شاخه‌زایی قلمه برگ سانسوریا نداشت. نتایج نشان‌دهنده این است که ایجاد برش V وارونه در انتهای نزد پاهنگ قلمه برگ تأثیر معنی‌داری روی باززایی گیاه از قسمت ابلق نزدِ پاهنگ قلمه برگ ندارد. بررسی‌های درون شیشه‌ای به کمک تنظیم‌کننده رشد توفوردی و کایتین نشان داد که ریز نمونه‌هایی که به مدت ۲۰ روز در محیط دارای ۰/۳۵ میلی‌گرم در لیتر توفوردی کشت شده و سپس به محیط دارای کایتین منتقل‌شده‌اند، از میانگین تعداد شاخساره بالاتری برخوردارند. اگرچه که استفاده از ریزنمونه برگ گرفته‌شده از قسمت سبز-ابلق در انگیزش گیاهان بافت ناهمسان مؤثر نبود با این‌وجود برخی از جهش‌های پلاستیدی رخ‌داده منجر به تولید گیاهان زال شد. گیاهان باززایی شده با برگ‌های سبز ناابلق با بازده ۱۰۰٪ در شرایط گلخانه زیر سیستم مه‌پاش سازگار شدند. درمجموع، به دلیل تشکیل مریستم نو از لایه‌های داخلی‌تر بافت ناهمسان برگ، تشکیل گیاهان بافت ناهمسان شبیه به گیاه مادری در این بررسی درون و برون شیشه‌ای میسر نشد.

**واژه‌های کلیدی:** بافت ناهمسان، پرآوری، سانسوریا، قلمه برگ، 2,4-D.

**مقدمه**

سانسوریا با نام علمی *Sansevieria trifasciata* L. به دلیل برگ‌های کشیده، گوشتی و جذاب و به دلیل مقاومت بالا به

[ Downloaded from flowerjournal.org on 2026-11-18 ]
[ DOI: 10.61186/flowerjournal.7.2.261 ]

شرایط محیطی و سازگاری با شرایط خانه، امروزه به میزان گسترده‌ای مورداستفاده قرار می‌گیرد. این گیاه افزون بر ارزش زینتی، در برگ خود دارای الیاف است (García-Hernández *et al*., 2022) که برای ساخت طناب، کلاه، لباس و مصارف دیگر استفاده می‌شود. از شیره نیساگ و ریشه آن در پزشکی استفاده می‌شود (Byrom, 1951). بیشتر گونه‌های تجاری سانسوریا متعلق به *S. trifasciata* می‌باشند.

ریزافزایی روشی برای تولید انبوه گیاهان عاری از بیماری در شرایط درون شیشه‌ای است. حفظ پایداری هم‌گروهی مهم‌ترین موضوعی است که در افزایش رویشی مطرح است. در گونه‌های بافت ناهمسان، شناخت ساختار بافت ناهمسان تا حدی در کاهش تغییرات ژنتیکی که در افزایش از مسیر باززایی نابجا رخ می‌دهد تأثیرگذار است. در بیشتر نهان‌دانگان، مریستم شاخساره از دو لایه که کورپوس[۱] را پوشانده‌اند تشکیل می‌شود که معروف به لایه‌های L1 و L2 هستند که به ترتیب تبدیل به روپوست و پوست[۲] ساقه می‌شوند. بیشتر جهش‌ها در این دولایه خارجی رخ می‌دهد و لایه کورپوس که نابافت ناهمسان (بافت همسان) است منشأ بیشتر تغییراتی است که طی باززایی نابه‌جا رخ می‌دهد (Donnelly & Ortiz-Medina, 2005). افزایش گیاهان تیره کراسولا و صبرزرد در محیط دارای 2,4-D و بنزیل آدنین گزارش شده است (Ferrolo *et al*., 2002; Ioannou, 1992 Ioannou and). در یک مطالعه برای افزایش درون شیشه‌ای سانسوریای پابلند از 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) برای انگیزش اولیه و پس از وقفه یک هفته‌ای، تولید گیاهک به کمک تنظیم‌کننده رشد کاینتین میسر شد (Blazich & Novitzky, 1984; Torres, 1989). در سال ۲۰۰٦ (Wahyuningsih, 2006) گزارش دیگری برای باززایی درون شیشه‌ای سانسوریای ابلق منتشر شد که در محیط MS (Murashige & Skoog, 1962) از قطعه‌های برگ یک‌سانتی متری در تماس با بنزیل آدنین و کاینتین استفاده نمودند. اما از میزان گیاهان بالغ ابلق تولیدشده گزارشی منتشر نکردند. همچنین در گزارشی دیگر سانسوریای پاکوتاه به‌وسیله غلظت‌های مختلف تنظیم‌کننده رشد بنزیل آدنین، تحریک به تولید شاخساره‌های نابه‌جا شد (Weltcheve & Svetleva, 2005). در گزارشی توانایی قسمت‌های مختلف برگ سانسوریای سبز در شرایط درون شیشه‌ای مورد ارزیابی قرار گرفت (Sarmast *et al*., 2009). در این گزارش پیش تیمار ریزنمونه‌های برگی با 2,4-D به مدت ۳ هفته و سپس قرار دادن ریزنمونه‌های برگ در محیط دارای ۰/٤ میلی‌گرم در لیتر کاینتین به بالاترین باززایی شاخساره نابجا منجر شد. در ادامه این شاخساره‌ها به کمک فروبری سریع در تنظیم‌کننده رشد Indole-3-butyric acid (IBA) ریشه‌دار و سپس سازگار شدند (Sarmast *et al*., 2009). در ریزافزایی گونه سانسوریای سیلندری[۳]، از دو تنظیم‌کننده رشد 2,4-D و IBA استفاده شد که منجر به تشکیل پینه و ساختارهای گره مانند روی قلمه‌های برگ شد. استفاده از ۵ میکرومولار بنزیل آدنین و ۲ میکرومولار نفتالن استیک اسید منجر به تولید ۱۷ شاخساره در هر ریز نمونه گردید. محیط کشت نیمه جامد دارای ۵ میکرومولار ایندول بوتریک اسید در گزارش آن‌ها به‌طور میانگین ۳/۵ ریشه در هر ریز نمونه با میانگین طول ٦ سانتی‌متر تولید نمود (Shahzad *et al*., 2009). در مطالعه‌ای دیگر به‌وسیله Yusnita و همکاران (۲۰۱۱)، دو نژادگان پاکوتاه و پابلند سانسوریای سبز برای ریزافزایی در محیط کشت موراشیگ و اسکوگ (MS) مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه ریزنمونه‌های برگی به مدت یک هفته در محیط دارای 2,4-D نگه‌داری شدند و پس

۱- Corpus ۲- Cortex ۳- *Sansevieria cylindrica*



[ Downloaded from flowerjournal.org on 2026-11-18 ]

[ DOI: 10.61186/flowerjournal.7.2.261 ]

از یک دوره استراحت یک هفته‌ای به محیط دارای بنزیل آدنین با غلظت‌های مختلف منتقل شدند. به‌طور متوسط از ۱۲ تا ۹ گیاهک در هر ریزنمونه سانسوریای بلند و کوتاه به ترتیب تولید شد که در ادامه به کمک ۲ میلی‌گرم در لیتر ایندول بوتریک اسید ریشه‌دار شدند. گیاهان ریشه‌دار شده با راندمان نزدیک به ۱۰۰ درصد در آمیخته‌های خاکی مستقر شدند. (Frank & Chitwood, 2016) متأسفانه گزارش قابل دسترسی از افزایش درون شیشه‌ای سانسوریای ابلق در منابع علمی موجود نیست و این موضوع ضرورت پژوهش و یافتن یک روش کارا در ریز افزایی اقتصادی این گیاه را بیش‌ازپیش آشکار می‌کند.

به دلیل وجود بافتِ ناهمسان از نوع پریکلینال در این گونه‌ی سانسوریا، تکثیر آن با قلمه برگ با موفقیت محدودی در تولید گونه‌های ابلق همراه بوده است. بنابراین در این پژوهش نوع قلمه برگ در آمیخته خاکی و همچنین بهترین ریزنمونه گیاهی و تیمار تنظیم‌کننده رشد برای رسیدن به حداکثر گیاهان ابلق دنبال می‌شود. نظر به پایین بودن راندمان تولید گیاهان ابلق با استفاده از روش تقسیم بوته در سانسوریا ابلق، معرفی روش‌های جایگزین که با راندمان بالایی به تولید گیاهان ابلق پایدار منجر شود حیاتی و سودآور خواهد بود.گزارش معتبر از ارزیابی نوع ریزنمونه در شرایط کشت درون شیشه‌ای و کشت گلخانه‌ای سانسوریای ابلق در ایران در دسترس نیست و مشخص نیست که آیا کشت بافت راندمان باززایی بهتری در مقایسه با کشت گلخانه‌ای دارد یا خیر و راندمان گیاهان تولیدشده از یک برگ بالغ این گیاه نیز در دسترس نیست. بنابراین هدف این پژوهش امکان‌سنجی تولید گیاهان سانسوریای ابلق در شرایط گلخانه در بستر آمیخته خاکی و همچنین تولید گیاهان بافت ناهمسان در شرایط کشت درون شیشه‌ای بود.

## موارد و روش‌ها

### مواد گیاهی

این پژوهش در شرایط محیطی درون گلخانه بر روی *Sansevieria trifasciata* var. *laurentii* و در شرایط کشت درون شیشه‌ای روی رقم پاکوتاه ابلق *Sansevieria trifasciata* cv. Golden Hahnii انجام شد. گیاهان بالغ بافت ناهمسان از گلخانه‌ای تجاری خریداری شدند.

### آزمایش اول: اثر نوع قلمه برگ و آمیخته خاکی

تیمارهای مورداستفاده در کشت گلخانه شامل ۳ محیط کشت پرلایت خالص و درشت، پرلایت با اندازه متوسط و نسبت برابری از کوکوپیت و پرلایت با اندازه متوسط (۱ به ۱ حجمی) بود. آمیخته‌های خاکی به‌صورت مجزا و با فاصله از یکدیگر بر روی شاسی گلخانه جای داده شدند. پس از مشاهده نتایج اولیه، در آزمایش‌های بعدی گلخانه‌ای، از بهترین آمیخته استفاده شد. در این آزمایش‌ها از آمیخته‌های خاکی استریل شده استفاده شد. از گلخانه مجهز به سیستم پاگرما و مه‌پاش برای افزایش گیاه استفاده شد. میزان پاشش سیستم مه‌پاش دو مرتبه در ساعت و به مدت ۸ ثانیه در نظر گرفته شد. تیمار دوم شامل استفاده از دو نوع قلمه برگ ساده با طول ۱۰ سانتی‌متر و قلمه برگ با برش V وارونه (برش در قلمه برگ به شکلی انجام شد که قسمت سبز برگ در ته قلمه برگ حذف و دو انتهای بافت ناهمسان باقی بماند).

آزمایش دوم: قلمه‌ها به تقریب ۱۰ سانتیمتر پس از برش با تیغ تمیز، به مدت ۱۰ دقیقه در محلول ۵ میلی‌گرم درلیتر قارچکش بنومیل غوطه‌ور شدند. سپس به مدت ۲۰ ساعت روی روزنامه تمیز قرار گرفتند تا خشک شوند و کشت شدند. قلمه‌ها به اندازه نصف طول خود در آمیخته‌های خاکی پرلایت یا پیت و پرلایت فرو برده شدند. بستر کاشت پیش از کاشت قلمه‌ها با




[ Downloaded from flowerjournal.org on 2026-11-18 ]

[ DOI: 10.61186/flowerjournal.7.2.261 ]

آب آبیاری مرطوب شده بود. قلمه‌های برگ در اسفند ماه ۹۸ در گلخانه کشت شدند. در آزمایش‌های گلخانه‌ای از سه تکرار برای هر تیمار و در هر تکرار از ۷ قلمه برگ استفاده شد. برای اطمینان از نتایج به‌دست‌آمده، آزمایش‌های بخش گلخانه‌ای دوبار به‌طور مستقل تکرار شد. تعداد شاخساره‌های باززایی شده از هر قلمه برگ، طول و عرض شاخساره، تعداد ریشه اصلی و فرعی روی گیاه باززایی شده، تعداد ریشه تشکیل‌شده روی قلمه اصلی و تعداد گیاهان تشکیل‌شده در قسمت سبز یا بافت ناهمسان قلمه ساده و V وارونه ازجمله داده‌های ثبت‌شده بود. واکاوی داده‌ها با آزمون T-test و به کمک آخرین نسخه نرم افزار R (4.3.0) انجام شد.

**گندزدایی سطحی و انگیزش پینه**

برگ‌های گیاه بافت ناهمسان سانسوریا پاکوتاه طلایی *Sansevieria trifasciata* cv. Golden Hahnii به قطعه‌های ۸ سانتی‌متری بریده شدند. ابتدا به مدت ۱۰ دقیقه در مایع ظرف‌شویی (۳ قطره در یک لیتر) غوطه‌ور شدند. نمونه‌ها در محلول اتانول ۷۰٪ به مدت ۳ دقیقه و سپس در محلول کلراکس ۱۰٪ به مدت ۱۰ دقیقه در زیر هود کشت بافت تیمار شدند. قطعه-های برگ دستکم ٦ بار با آب مقطر استریل شستشو داده شدند. با استفاده از تیغ جراحی استریل، قطعه‌های ۱ سانتی‌متر مربعی از روی این قطعه‌های برگ بریده شدند و در محیط MS کشت شدند. درمجموع دو نوع ریزنمونه متفاوت برای این پژوهش استفاده شد. ریز نمونه‌هایی که به‌طور کامل از قسمت بافت ناهمسان حاشیه برگ‌های سانسوریا تهیه شد و ریزنمونه‌هایی که هم دارای ناحیه بافت ناهمسان و هم دارای ناحیه سبز بودند (شکل ۱). این ریز نمونه‌ها روی سطح محیط کشت به شکلی که ناحیه برش‌خورده در تماس با محیط کشت قرار گیرد خوابانده شدند. برای انگیزش پینه از تنظیم‌کننده رشد 2,4-D در ۳ غلظت ۰/۳۵، ۰/۷ و ۱/٤ میلی‌گرم در لیتر استفاده شد. پس از گذشت سه هفته و مشاهده نشانه‌های انگیزش پینه، ریزنمونه‌ها به محیط حاوی غلظت‌های مختلف کاینتین (Sarmast *et al*. 2009) برای باززایی منتقل شدند.



**شکل ۱- دو نوع قلمه برگ (تصویر سمت چپ) و سه نوع ریز نمونه برگی برای کشت درون شیشه‌ای (تصویر سمت راست).**

**Figure 1- Two types of leaf cuttings (left) and three types of explants for *in vitro* culture (right).**

**سازگاری**

گیاهان باززایی شده با طول شاخساره بیش از ۵ سانتی‌متر از محیط آگار جدا شدند. ریشه‌ها به کمک آب ولرم از آلودگی آگار پاک شدند و سپس در آمیخته خاکی دارای کوکوپیت و پرلایت و زیر سیستم مه‌پاش سازگار شدند.

در آزمایش‌های کشت بافتی از ٤ تکرار برای هر تیمار و ۵ ریز نمونه برگی در هر تکرار استفاده شد. واکاوی داده‌ها با آزمون T-test و LSD و به کمک آخرین نسخه نرم افزار آر (4.3.0) انجام شد.



[ Downloaded from flowerjournal.org on 2026-11-18 ]

[ DOI: 10.61186/flowerjournal.7.2.261 ]

## نتایج

### اثر نوع قلمه برگ در انگیزش گیاهان بافت ناهمسان در آمیخته‌های خاکی

در بررسی‌هایی که روی دو نوع قلمه برگ متفاوت (قلمه ساده و قلمه‌های با برشV وارونه) در بیش از ۲۰۰ قلمه برگ سانسوریا در دو آزمایش جداگانه انجام شد، هیچ نشانه‌ای از اثرگذاری نوع قلمه برگ در انگیزش گیاهان بافت ناهمسان مشاهده نشد. بنابراین این آزمایش، فرضیه اینکه نوع قلمه و به‌ویژه اینکه استفاده از قلمه‌های معروف به قلمه‌های با برش ته هشتی یا V وارونه احتمال تولید گیاهان بافت ناهمسان را افزایش می‌دهد، رد می‌نماید. حتی گیاهان باززایی شده از قسمت‌های بافت ناهمسان نیز تنها گیاهان غیر بافت ناهمسان (گیاهان سبز) تولید نمودند (شکل ۲). تنها ۱٪ گیاهان باززایی شده گیاه به‌طورکامل ابلق تولید نمودند که به‌جای دو نوار زرد در اطراف برگ، دارای برگ ابلق و زرد بودند (شکل ۳-الف).



**شکل ۲- گیاهان سبز باززایی شده از قسمت بافت‌ناهمسان. فلش‌های مشکی در پایین تصویر منشأ گیاهان باززایی شده از قسمت زرد را نشان می‌دهد.**

**Figure 2- Representatives of regenerated green plants originated from chimeric tissue. Black arrows indicating the origin of regeneration from the yellow section of the leaf.**

### بررسی اثر آمیخته‌های خاکی متفاوت در راندمان باززایی قلمه برگ سانسوریا

با توجه به اینکه در پژوهش‌های صورت گرفته در داخل و خارج از کشور، مطالعه‌ای روی اثر بسترهای متفاوت بدون خاک در باززایی قلمه برگ سانسوریا موجود نبود، تصمیم گرفته شد در یک آزمایش مقدماتی اثر چند آمیخته خاکی در باززایی سانسوریا ابلق بررسی شود. بررسی‌های صورت گرفته بیانگر آن است که پس از گذشت ۸ ماه از زمان کشت قلمه‌ها، بسترهای حاوی پرلایت متوسط و کوکوپیت و پرلایت در مقایسه با بستر پرلایت درشت به‌مراتب تعداد شاخساره‌های بیشتر را باززایی نمودند. همچنین طول شاخسارهای تولیدشده نیز در این دو محیط کشت بالاتر از محیط دارای پرلایت درشت بود هرچند که اختلاف از لحاظ آماری معنی‌دار نبود (جدول ۱).



[ Downloaded from flowerjournal.org on 2026-11-18 ]

[ DOI: 10.61186/flowerjournal.7.2.261 ]

به نظر می‌رسد که میزان در دسترس بودن آب و یا تأمین آب در قلمه‌های کشت‌شده در بستر دارای پرلایت درشت به دلیل قدرت بسیار پایین در نگه‌داری آب، کمتر بود. به عبارتی هراندازه که تجمع رطوبت سبب آسیب به قلمه و ریشه‌های تازه تشکیل‌شده می‌شود، به همان اندازه هم بستر کشت حاوی ذرات درشت که قادر به نگهداری مناسب آب نیستند، سبب محدودیت ریشه‌زایی و تولید شاخساره در قلمه‌ی کشت‌شده می‌شوند.

**جدول ۱- بررسی سه آمیخته خاکی متفاوت در روی تعداد و طول شاخساره‌های باززایی شده قلمه برگ سانسوریا پس از ٦ ماه.**

**Table 1- Effects of three different soil mixtures on length and number of shoots after 6 months of cultures.**

| تیمارها<br>Treatments | میانگین تولید شاخساره<br>The mean of shoot production | ارتفاع گیاهان تولید شده (cm)<br>Shoot height of regenerated plants (cm) |
|---|---|---|
| پرلایت درشت<br>Big-sized Perlite | 1.6 | 14.7 |
| پرلایت متوسط<br>Medium-sized Perlite | 3** | 17.8 |
| کوکوپیت + پرلایت<br>Cocopeat+Perlite | 3** | 16.1 |

ns عدم معنی داری و **معنی‌دار در سطح آماری ۰/۰۱، آزمون T-test در نرم‌افزار آر در مقایسه با بستر پرلایت درشت انجام شد.

ns, * and ** are non-significant and significant at 0.05 and 0.01, respectively based on T-test on R software.

### اثر نوع قلمه برگی بر قدرت باززایی گیاهان دختری

### محیط کوکوپیت و پرلایت

بررسی‌های انجام‌شده در خصوص اثر دو نوع قلمه ساده و V وارونه روی ویژگی‌های ریخت‌شناسی شاخساره و ریشه‌های باززایی شده بیانگر آن است که تنها ارتفاع شاخساره‌های تولید شده و همچنین ریشه‌های تشکیل‌شده روی قلمه اصلی در دو نوع قلمه ازنظر آماری تفاوت داشتند.

جدول ۲- اثر نوع قلمه برگی در رابطه با برخی از ویژگی‌های مورفولوژیک گیاهان باززایی شده در بستر کوکوپیت و پرلایت.

**Table 2- Effects of leaf cutting type on some morphological characteristics of regenerated plants grown on cocopeat and perlite.**

| نوع قلمه<br>Cutting type | تعداد شاخساره<br>Shoot number | طول شاخساره (cm)<br>Shoot length (cm) | عرض شاخساره (cm)<br>Shoot Width (cm) | تعداد ریشه اولیه روی گیاه<br>Primary root number | تعداد ریشه فرعی روی گیاه<br>Secondary root number | تعداد ریشه روی برگ گیاه مادری<br>Root number on mother leaf cutting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قلمه ساده<br>Simple leaf cutting | 1.03 ns | 22 | 2.3 ns | 4.8 ns | 34.3 ns | 22.8 |
| برش V وارونه<br>Reversed V shaped | 1.16 | 29.2** | 2.7 | 6.59 | 35.6 | 36.5** |


ns عدم معنی داری و *معنی دار در سطح آماری ۰/۰۵، **معنی دار در سطح آماری ۰/۰۱، ***معنی دار در سطح آماری ۰/۰۰۱ با استفاده از آزمون T-Test در نرم افزار آر.

ns, * and ** are non-significant and significant at 0.05 and 0.01, respectively based on T-test on R software.



[ Downloaded from flowerjournal.org on 2026-11-18 ]

[ DOI: 10.61186/flowerjournal.7.2.261 ]




**شکل ۳- A: تولید گیاه ابلق زرد از ناحیه بافت ناهمسان قلمه برگ. B: تولید گیاه غیر ابلق از ناحیه بافت ناهمسان. C: قلمه‌های برگ سانسوریا ابلق با برش V وارونه در بالا و قلمه‌های برگ با برش ساده در پایین تصویر.**

**Figure 3- A: Production yellow chimeric plants from chimeric section of leaf cutting B: production of non-chimeric plant from chimeric section. C: Representative of Sansevieria leaf cutting with inverted V like cuts (above), and leaf cutting with simple cut (bottom).**

## محیط پرلایت

بررسی‌های انجام‌شده در خصوص اثر نوع قلمه در محیط کشت دارای پرلایت نشان‌دهنده این است که تفاوت معنی‌داری بین گیاهان باززایی شده در قلمه ساده و قلمه V وارونه وجود ندارد. نکته جالب این‌که تعداد ریشه‌های تشکیل‌شده در قلمه دارای برش V وارونه بیشتر از قلمه ساده است. این موضوع به این دلیل است که در برش V وارونه ایجادشده میزان سطح مقطع ایجادشده نسبت به قلمه ساده بیشتر بوده و این موضوع توجیه‌کننده تولید ریشه بیشتر است. در محیط دارای پرلایت، افزایش ۱/۵ برابری در میزان باززایی شاخساره جدید در قلمه V وارونه نسبت به قلمه ساده ایجاد شد اما این افزایش ازنظر آماری معنی‌داری نبود.

**جدول ۳- اثر نوع قلمه برگ در باززایی گیاه در محیط کشت دارای بستر پرلایت.**

**Table 3- Effects of leaf cutting type on plant regeneration from perlite soil mixture.**

| نوع قلمه<br>Cutting type | تعداد شاخساره<br>Shoot number | طول شاخساره (cm)<br>Shoot length (cm) | عرض شاخساره (cm)<br>Shoot Width (cm) | تعداد ریشه اولیه روی گیاه<br>Primary root number | تعداد ریشه فرعی روی گیاه<br>Secondary root number | تعداد ریشه روی برگ گیاه مادری<br>Root number on mother leaf cutting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قلمه ساده<br>Simple leaf cutting | 1.1 $^{ns}$ | 24.5 $^{ns}$ | 2.5 $^{ns}$ | 6.2 $^{ns}$ | 54.6 $^{ns}$ | 25.1 |
| برش V وارونه<br>Inverted V shaped | 1.7 | 25.6 | 2.6 | 6.2 | 56.9 | 41.4$^{**}$ |

ns عدم معنی داری و $^{*}$معنی‌دار در سطح آماری ۰/۰۵، $^{**}$معنی‌دار در سطح آماری ۰/۰۱، $^{***}$معنی‌دار در سطح ۰/۰۰۱ با استفاده از آزمون T-Test در نرم افزار آر.

$^{ns}$, * and ** are non-significant and significant at 0.05 and 0.01, respectively based on T-test on R software.



[ Downloaded from flowerjournal.org on 2026-11-18 ]

[ DOI: 10.61186/flowerjournal.7.2.261 ]

**اثر محیط کشت بدون خاک در راندمان باززایی قلمه‌های سانسوریای ابلق**

بدون توجه به نوع قلمه، اثر محیط کشت بر برخی از عوامل مرتبط با ریشه و شاخساره موردبررسی قرار گرفت. نظر به اینکه در آزمایش‌های مقدماتی، استفاده از محیط دارای پرلایت درشت در رابطه با تولید شاخساره مؤثر نبود بنابراین در این آزمایش از محیط کشت پرلایت متوسط و محیط دارای کوکوپیت و پرلایت استفاده شد. نتایج بیانگر این است که نوع بستر استفاده‌شده در تعداد و طول شاخساره‌های باززایی شده بی‌تأثیر است اما تعداد ریشه‌های اولیه تشکیل‌شده در روی قلمه برگ اصلی و تعداد ریشه‌های فرعی تشکیل‌شده در گیاهان باززایی شده به شکل معنی‌داری در بستر پرلایت کمتر از بستر کوکوپیت و پرلایت می‌باشد.

جدول ٤- اثر نوع آمیخته خاکی بر ویژگی‌های ریخت‌شناسی گیاهان تولید شده پس از ۸ ماه از شروع کشت.

**Table 4- Effects of soil mixture types on morphological characteristics of regenerated plants after 8 months of culture.**

| نوع آمیخته خاکی Type of soil mixture | تعداد شاخساره Shoot number | طول شاخساره (cm) Shoot length (cm) | عرض شاخساره (cm) Shoot Width (cm) | تعداد ریشه اولیه روی گیاه Primary root number | تعداد ریشه فرعی روی گیاه Secondary root number | تعداد ریشه روی برگ گیاه مادری Root number on mother leaf cutting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پرلایت Perlite | 1.1 ns | 25.6 ns | 2.55 ns | 5.36ns | 34.9 | 29.7 |
| کوکوپیت+پرلایت Cocopeat+perlite | 1.43 | 24.2 | 2.54 | 6.22 | 55.8*** | 33.3*** |

*معنی‌دار در سطح آماری ۰/۰۵، **معنی‌دار در سطح آماری ۰/۰۱، ***معنی‌دار در سطح آماری ۰/۰۰۱ با استفاده از آزمون T-Test در نرم افزار آر.

ns, * and ** are non-significant and significant at 0.05 and 0.01, respectively based on T-test on R software.

**اثر نوع قلمه برگ بر میزان باززایی از قسمت بافت ناهمسان**

نتایج به‌دست‌آمده از جدول ۵ بیانگر این است که تفاوت معنی‌داری در باززایی گیاه از قسمت سبز در قلمه‌های V وارونه و ساده وجود ندارد. به عبارت ساده‌تر ایجاد برش V وارونه در روی قلمه گیاهان بافت ناهمسان سانسوریا در افزایش باززایی از قسمت بافت ناهمسان (نوار زرد اطراف برگ) مؤثر نیست. اگرچه که میزان باززایی از قسمت بافت ناهمسان در قلمه V وارونه نسبت به قلمه ساده بیشتر است اما این مشاهده بر اساس آزمون T معنی‌دار نمی‌باشد. علاوه بر این تمامی گیاهان باززایی شده از قسمت بافت ناهمسان (زرد) حتی در قلمه‌های V وارونه (به جز یک مورد) قادر به تولید گیاهان ابلق نشدند.

**بررسی گندزدایی سطحی و بررسی بقاء سه نوع ریز نمونه متفاوت در شرایط درون شیشه‌ای**

نتایج گندزدایی سطحی نشان داد که استفاده از اتانول ۷۰٪ و کلراکس ۱۰٪ به مدت ۱۰ دقیقه کاملاً در گندزدایی سطحی مؤثر عمل نموده است. نتایج بررسی‌های کشت درون شیشه‌ای بیانگر این است که از میان سه نوع ریز نمونه سبز، سبز و ابلق و ریزنمونه کاملاً ابلق استفاده‌شده (شکل ۱) در این پژوهش، ریز نمونه‌های به‌طور کامل ابلق (زرد رنگ) قادر به تولید پینه نبوده و پس از یک زیر کشت در محیط MS آبگز شده و از بین رفتند. وجود ۳۰ گرم در لیتر شکر نیز در ممانعت از آبگز



[ Downloaded from flowerjournal.org on 2026-11-18 ]

[ DOI: 10.61186/flowerjournal.7.2.261 ]

شده این ریز نمونه‌ها مؤثر نبود. در عوض ریزنمونه‌های سبز ابلق و ریز نمونه‌های سبز زنده ماندند و شروع به باززایی نمودند. با توجه به اینکه هدف این پژوهش انگیزش تولید گیاهان بافت ناهمسان بوده است، بنابراین در آزمایش‌های کشت بافتی تنها از ریزنمونه‌های دارای بافت سبز به همراه بافت ابلق (زرد) استفاده شد.

**جدول ۵- راندمان باززایی گیاه از قسمت‌های بافت ناهمسان و غیر بافت ناهمسان در دو نوع قلمه برگ.**

**Table 5- Regeneration frequency from chimeric and non-chimeric section in two types of leaf cuttings.**

| نوع قلمه<br>Cutting type | باززایی از قسمت سبز<br>Regeneration from green section | باززایی از قسمت زرد<br>Regeneration from yellow section |
|---|---|---|
| قلمه ساده<br>Simple leaf cutting | 2.4 | 0.44 |
| برش V وارونه<br>V shaped cutting | 1.88 $^{ns}$ | 0.77 $^{ns}$ |

$^{*}$معنی‌دار در سطح آماری ۰/۰۵، $^{**}$معنی‌دار در سطح آماری ۰/۰۱، $^{***}$معنی‌دار در سطح آماری ۰/۰۰۱ با استفاده از آزمون T-Test در نرم افزار آر.

$^{ns}$, * and ** are non-significant and significant at 0.05 and 0.01, respectively based on T-test on R software.

**امکان‌سنجی تولید گیاهان بافت ناهمسان در شرایط درون شیشه‌ای**

بررسی‌های صورت گرفته بر روی قلمه برگ سانسوریای پاکوتاه ابلق در خصوص انگیزش تولید گیاهان بافت ناهمسان شبیه گیاه مادری با موفقیت همراه نبود. نظر به اینکه ریز نمونه‌های کاملاً سبز بر اساس گزارش‌های از پیش موجود (Sarmast *et al.*, 2009) منجر به تولید گیاهان سبز می‌شدند، بنابراین از این ریز نمونه‌ها استفاده نشد. از طرفی ریز نمونه‌های گرفته‌شده از قسمت‌های کاملاً زرد قادر به تولید پینه نبودند و پس از یک زیر کشت خودبه‌خود از بین رفتند. بنابراین ریز نمونه‌های که هم قسمت زرد و هم قسمت سبز داشتند به‌عنوان ریز نمونه اصلی در این پژوهش استفاده شد. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که در موارد جزئی، از نواحی ابلق شاخساره‌های کاملاً ابلق قادر به باززایی خواهند بود. اما این شاخساره‌های زال حتی پس از گذشت ۱۵ ماه دارای سرعت رشد محدود بوده و زال باقی ماندند (شکل ٤).


**راندمان باززایی گیاهان سانسوریا در پاسخ به تنظیم‌کننده‌های رشد در شرایط درون شیشه‌ای**

نتایج بررسی‌های اولیه حاکی از آن است که ریزنمونه‌ها در پاسخ به تنظیم‌کننده رشد اکسین پس از دو ماه پاسخ نشان داده و نشانه‌های باززایی و تولید پینه را از خود نشان می‌دهند. در ریز نمونه‌ها، هم اندام‌زایی مستقیم و هم غیرمستقیم قابل‌تشخیص بود (شکل ۵). نتایج بیانگر این است که اندام‌زایی مستقیم و غیرمستقیم در انگیزش تولید گیاهان بافت ناهمسان نقشی ندارد. به نظر می‌رسد که منشأ عمده گیاهان باززایی شده از قسمت داخلی‌تر اپیدرم باشد و این موضوع می‌تواند دلیلی بر تولید گیاهان با برگ سبز از قسمت‌های ابلق برگ در نظر گرفته شود. نتایج بیانگر این است که اختلاف معنی‌داری میان سه غلظت 2,4-D در وزن‌تر پینه تولیدشده وجود ندارد (جدول ٦).




[ Downloaded from flowerjournal.org on 2026-11-18 ]

[ DOI: 10.61186/flowerjournal.7.2.261 ]




شکل ٤- شاخساره‌های زال تشکیل‌شده از قسمت‌های بافت ناهمسان ریزنمونه‌ها. A و B: فلش‌های مشکی نشان‌دهنده گیاهان باززایی شده زال می‌باشد. توجه نمایید که گیاهان زال و سبز هر دو از روی یک ریزنمونه باززایی شده‌اند. C: گیاه جهش‌یافته بدون کلروفیل پس از گذشت ۱۵ ماه.

**Figure 4- Produced albino shoots from chimeric section of explants. A, B: Black arrow represents regenerated albino plants. Note that albino and green plants both regenerated from the same explant. C: Mutated plants without chlorophyll after 15 months.**




شکل ٥- A: اندام‌زایی مستقیم از ریزنمونه بافت ناهمسان. به باززایی از دو قسمت سبز و ابلق روی ریزنمونه توجه کنید. B: اندام‌زایی غیرمستقیم در ریزنمونه سانسوریا.

**Figure 5- A: Direct organogenesis from chimeric sections. Note the regeneration of the two parts of green and chimeric on single explant. B. Indirect organogenesis from Sansevieria leaf explant.**



[ Downloaded from flowerjournal.org on 2026-11-18 ]

[ DOI: 10.61186/flowerjournal.7.2.261 ]

**جدول ٦- وزن تر پینه‌های تولید شده از ریز نمونه‌های بافت ناهمسان برگ ۳ ماه پس از کشت.**

**Table 6- Callus fresh weight of chimeric tissue after three months of culture.**

| 2,4-D (میلی‌گرم درلیتر)<br>2.4-D (mg $L^{-1}$) | وزن تر پینه (گرم)<br>Callus fresh weight (g) |
|---|---|
| 0.35 | 1.20 [a] |
| 0.7 | 1.74 [a] |
| 1.4 | 1.32 [a] |

میانگین‌ها از نظر آماری در سطح ۵٪ آزمون LSD تفاوت معنی‌داری ندارند.

Means are not significantly different at P=5%, LSD.

بیشترین میانگین تعداد پرآوری در هر ریزنمونه، مربوط به ریزنمونه‌هایی بود که ابتدا به مدت ۲۰ روز در محیط MS حاوی ۰/۳۵ میلی‌گرم در لیتر تنظیم‌کننده رشد 2,4-D بودند و سپس به محیط دارای کاینتین (۰/۳ میلی‌گرم) منتقل شدند (شکل ٦). استفاده از غلظت‌های متفاوت 2,4-D بر روی طول شاخساره اثر معنی‌داری نداشت.

**جدول ۷- میانگین طول و تعداد شاخساره پرآوری شده در ریز نمونه‌های کشت‌شده در محیط دارای 2,4-D به مدت ۲۰ روز و سپس کاشت در محیط مشابه دارای ۰/۳ میلی‌گرم درلیتر کاینتین پس از ۵ ماه از شروع کشت.**

**Table 7- The mean number of proliferated shoots and their length on media supplemented with 2,4-D for 20 days and the same media with 0.3 mg/L Kin after 5 months of culture.**

| 2,4-D (میلی‌گرم درلیتر)<br>2.4-D (mg $L^{-1}$) | کاینتین (میلی‌گرم درلیتر)<br>Kin (mg $L^{-1}$) | طول شاخساره (cm)<br>Shoot length (cm) | پرآوری شاخساره<br>Shoot proliferation |
|---|---|---|---|
| 0.35 | 0.3 | 1.97 [a] | 6.7 [a] |
| 0.7 | 0.3 | 1.64 [a] | 3.3 [b] |
| 1.4 | 0.3 | 1.83 [a] | 1.8 [c] |

میانگین‌هایی که حروف مشترک دارند از نظر آماری در سطح ۵٪ آزمون LSD تفاوت معنی‌داری ندارند.

In each column, means followed by similar letters are not significantly different at P=5%, LSD.



**شکل ٦- گیاهک‌های پرآوری شده از ریز نمونه بافت ناهمسان گرفته‌شده از سانسوریا پاکوتاه. ریز نمونه‌ها به مدت ۲۰ روز در محیط داری ۱/٤ میلی‌گرم در لیتر 2,4-D انگیزش و سپس به محیط دارای ۰/۳۵ میلی‌گرم در لیتر کاینتین منتقل شدند.**

**Figure 6- Proliferated plantlets originated from chimeric explant of dwarf *Sansevieria*. Explants induced in media supplemented with 1.4 mg/L 2,4-D for 20days whereupon transferred to media supplemented with 0.35 mg/L Kin.**



[ Downloaded from flowerjournal.org on 2026-11-18 ]

[ DOI: 10.61186/flowerjournal.7.2.261 ]

### ریشه‌زایی و بازده سازگاری گیاهان کشت بافتی

سانسوریا از دسته گیاهان آسان ریشه‌زا است (شکل ۷) و نگه‌داری گیاهان در محیط MS بدون تنظیم‌کننده رشد، منجر به ریشه‌زایی می‌شود. گیاهک‌های باززایی شده با ارتفاع بیش از ۵ سانتی‌متر به آمیخته‌های خاکی دارای پیت و پرلایت (نسبت ۱ به ۱) و مجهز به سیستم مه افشان منتقل شدند. نتایج نشان داد که ۱۰۰٪ گیاهان باززایی شده در محیط گلخانه سازگار شدند.




**شکل ۷- گیاهک ریشه‌دار شده و آماده برای انتقال به آمیخته خاکی در گلخانه (A)، (B): گیاهان کشت بافتی سازگار شده در آمیخته خاکی.**

**C: گیاه ۱٦ ماه پس از شروع کشت.**

**Figure 7- Plantlets with roots prepared for transferring to soil mixture. A, B: Acclimatized plants C. Plants after 16 months of culture.**

### بحث

دو هدف اصلی افزایش هم‌گروهی گیاهان زینتی شامل تولید تعداد زیادی گیاه از گیاه مادری و هدف دوم حفظ ویژگی شبیه به اصل بودن در گیاهان باززایی شده با افزایش رویشی است. گیاهان زینتی بافت‌ناهمسان به دلیل تغییرات ژنتیکی ایجادشده در بافت‌های رویشی خود، اهمیت زیادی در گل‌کاری دارند (Frank & Chitwood, 2016). این ویژگی ازآن‌جهت بااهمیت است که گیاهان بافت ناهمسان نسبت به گیاه مادری جذابیت ظاهری بالاتری دارند. نظر به اینکه افزایش جنسی این گیاهان بافت ناهمسان تقریباً غیرممکن است، بنابراین افزایش رویشی، تنها راه‌حل افزایش هم‌گروهی این گیاهان است. گیاه زبان مادر زن یا سانسوریا ازجمله گیاهان برگ‌ساره‌ای بسیار مقاوم به شرایط درون‌خانه است که دارای ارقام فراوانی است. افزایش از طریق ریزوم و جدا نمودن پاگیاه ازجمله روش‌های افزایش هم‌گروهی این گیاه بافت ناهمسان است که دارای راندمان پایینی است و در طول سال تعداد بسیار کمی گیاه ابلق قابل‌تولید خواهد بود. افزایش رویشی این گیاه زینتی به کمک قلمه‌برگ مورد بحث و اختلاف‌نظر بسیاری بوده است. بسیاری از پرورش‌دهندگان و تولیدکنندگان اعتقاد دارند که استفاده از قلمه‌های دارای برش V در انتهای وارونه پاهنگ که منجر به حذف قسمت‌های سبز در ارقام ابلق می‌گردد، شانس تولید گیاهان بافت ناهمسان را افزایش می‌دهد.این در حالی است که تاکنون هیچ گزارش علمی در این زمینه منتشر نشده است. بنابراین، برای روشن شدن این موضوع، دو نوع قلمه برگ ساده و دارای برش V وارونه در گیاهان ابلق سانسوریای پابلند و در آمیخته‌های خاکی مختلف در شرایط گلخانه مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج دو تکرار کامل آزمایش با بیش از ۲۰۰ قلمه برگ به‌کاررفته آشکارا بیانگر آن است که شانس تولید گیاهان بافت ناهمسان از قلمه برگ بسیار ناچیز خواهد بود و با اطمینان می‌توان گفت که



[ Downloaded from flowerjournal.org on 2026-11-18 ]

[ DOI: 10.61186/flowerjournal.7.2.261 ]

احتمال افزایش سانسوریای ابلق به‌وسیله قلمه برگ از گیاهان ابلق، کمتر از ۱ درصد است. در آزمایش دوم اثر سه آمیخته خاکی در رابطه با بستر بهینه برای افزایش سانسوریا مورداستفاده قرار گرفت. نتایج بیانگر این است که استفاده از محیط دارای پرلایت درشت به‌اندازه پرلایت بافت متوسط کارایی ندارد. درحالی‌که بستر پرلایت متوسط و کوکوپیت و پرلایت اثر مشابه‌ای نشان دادند. استفاده از آمیخته‌های خاکی متفاوت و اهمیت آن‌ها در افزایش گیاهان زینتی مختلف پیش‌تر موردبررسی قرارگرفته است. در یک مطالعه، اثر آمیخته‌های خاکی پیت خزه، ضایعات نارگیل (کوکوپیت)، ضایعات نخل (پالم پیت) و باگاس نیشکر به‌صورت خالص و همچنین آمیخته با ۵۰ درصد پرلایت بر روی گیاه پتوس موردبررسی قرار گرفت (Samiei *et al*., 2005). بیشترین تعداد و سطح برگ، وزن‌تر و خشک اندام هوایی و ریشه، تعداد پاگیاه و طول پیچ در بستر کشت کوکوپیت و کمترین آن در باگاس نیشکر مشاهده شد. اثر آمیخته خاکی پرلایت به‌تنهایی و یا پرلایت و شن کوآرتز بر بسیاری از عامل رشدی گیاه اسپاتی‌فیلوم به اثبات رسیده است (Kakoui & Salehi, 2011). همچنین تیمار ۱۰ گرم زئولیت در کیلوگرم آمیخته خاکی اثر مثبتی بر وزن‌تر ریشه و عمق ریشه‌دهی گل نرگس دارد (Nazari *et al*., 2014). نتایج آزمایش‌هایی که در دو آمیخته پرلایت و کوکوپیت و پرلایت تنها به کمک قلمه‌های ساده و V وارونه سانسوریا ابلق انجام شد، نشانگر این است که این دو محیط کشت تأثیر متفاوت و معنی‌داری بر تعداد گیاهان باززایی شده از دو نوع مختلف قلمه برگ ندارند. تنها تعداد ریشه تشکیل‌شده بر روی قلمه مادری در دو نوع قلمه در محیط دارای پرلایت و طول شاخساره و تعداد ریشه روی قلمه برگ در قلمه برگ V وارونه در محیط دارای کوکوپیت و پرلایت با قلمه ساده متفاوت بود. نتایج بررسی آمیخته خاکی نشان می‌دهد که تعداد ریشه‌های فرعی بر روی گیاهان باززایی شده از روی قلمه برگ در آمیخته خاکی دارای کوکوپیت و پرلایت نسبت به پرلایت تنها، بیشتر است. وجود تعداد بالاتر این ریشه‌های فرعی اثر مثبتی در استقرار این قلمه در محل نهایی رشد خواهد داشت. آزمایش‌های درون شیشه‌ای روی رقم پاکوتاه ابلق سانسوریا (رقم هاهانی طلایی) انجام شد. نتایج آزمایش‌های درون شیشه‌ای نیز در تولید گیاهان بافت ناهمسان موفقیت‌آمیز نبود. باوجود باززایی گیاهان زال از روی ریزنمونه‌های بافت ناهمسان، اما این باززایی حالت تصادفی داشته و قابل تکرار نبود. از طرفی گیاهان زال باززایی شدهِ در زیر کشت‌ها، دارای رشد محدود بودند. غیرازاین موارد بسیار محدود مشاهده‌شده، تمام گیاهان باززایی شده دارای برگ‌های سبز و غیر ابلق بودند. در ریزافزایی گونه سانسوریای سیلندری دو تنظیم‌کننده رشد 2,4-Dو IBA منجر به تشکیل پینه و ساختارهای گره مانند شدند. استفاده از ۵ میکرومولار بنزیل آدنین و ۲ میکرومولار نفتالن استیک اسید منجر به تولید ۱۷ شاخساره در هر ریز نمونه گردید (Shahzad *et al*., 2009) این در حالی است که میانگین تعداد گیاه باززایی شده در هر ریز نمونه برگ در رقم سانسوریای ابلق پاکوتاه ۶/۷ بوده است. در مطالعه‌ای دیگر به‌وسیله Yusnita و همکاران (۲۰۱۱)، دو نژادگان پاکوتاه و پابلند سانسوریای سبز برای ریزافزایی در محیط کشت MS مورد بررسی قرار گرفت. در گزارشی دیگر پس از کشت اولیه ریزنمونه‌های برگ در محیط MS دارای IBA، تولید شاخساره با افزایش دمای روزانه محیط به ۳۷ درجه سلسیوس میسر شد (Kaur & Mudgal, 2021). بررسی میزان باززایی شاخساره میان سانسوریای پاکوتاه و پابلند هیچ تفاوت معنی‌داری را نشان نمی‌دهد (García-Hernández *et al*., 2022). در این مطالعه ریزنمونه‌های برگی به مدت یک هفته در محیط دارای 2,4-D نگه‌داری شدند و پس از یک دوره استراحت یک هفته‌ای به محیط دارای بنزیل‌آدنین با غلظت‌های مختلف منتقل شدند. به‌طور متوسط بین ۹ تا ۱۲ گیاهک به ترتیب در هر ریزنمونه سانسوریای بلند و کوتاه تولید شد و این



[ Downloaded from flowerjournal.org on 2026-11-18 ]

[ DOI: 10.61186/flowerjournal.7.2.261 ]

ریزشاخساره‌ها به کمک ۲ میلی‌گرم در لیتر ایندول بوتریک اسید ریشه‌دار شدند. متأسفانه در گزارش‌های محدود در خصوص افزایش درون شیشه‌ای سانسوریا، گزارش قابل‌دسترسی در خصوص ارقام ابلق سانسوریا در دست نیست. اما افزایش هم‌گروهی بنفشه آفریقایی دارای بافت ناهمسان (رقم 'Crimson Frost') به کمک باززایی شاخساره نابجا از برگ، منجر به ٦۷ درصد تغییرات در رنگ گل و ۱۹ درصد تغییرات در شکل برگ گیاهان باززایی شده در کشت بافت گردید (Pack & Hahn, 2019). این در حالی است که افزایش درون شیشه‌ای *Haworthia retusa* × *cooperi* 'Variegata' با استفاده از تولید شاخساره نابجا منجر به باززایی گیاهان بافت ناهمسان شد (Yan *et al.*, 2017). این نتایج بیانگر این است که دامنه وسیعی از عوامل که در حفظ هم‌گروهی در شرایط درون شیشه‌ای تأثیرگذار است به‌خوبی شناخته نشده است (Donnelly & Ortiz-Medina, 2005). در پژوهش حاضر به نظر می‌رسد که منشأ عمده گیاهان باززایی شده از قسمت داخلی‌تر اپیدرم قلمه برگ ابلق باشد و این موضوع می‌تواند دلیلی بر تولید گیاهان با برگ سبز از قسمت‌های ابلق برگ در نظر گرفته شود. برای حفظ ویژگی هم‌گروهی در گونه‌های بافت ناهمسانی، انتخاب دقیق روش افزایش، فهم و شاخت تغییراتی که به گیاهان باززایی شده به ارث می‌رسد به‌ویژه نوع بافت ناهمسانی در ریز نمونه‌ها و غربالگری دقیق نمونه‌های باززایی شده برای حفظ ویژگی شبیه به اصل بودن در افزایش از طریق باززایی جوانه نابجا مؤثر خواهد بود (Donnelly & Ortiz-Medina, 2005). به‌هرحال مطالعات جامع‌تر به کمک تکنیک لایه نازک سلولی در انگیزش گونه‌های ابلق سانسوریا ضروری است.

## منابع


Blazich, F.A., Novitzky, R.T. (1984). *In vitro* propagation of *Sansevieria trifasciata*. *HortScience, 19*(1), 122-123.

Donnelly, D.J., Ortiz-Medina, E. (2005). Micropropagation and genetic risk: securing clonal fidelity. Proceedings of The International Workshop On True-To-Typeness of Date Palm Tissue Culure-Derived Plants Morocco.

Frank, M.H., Chitwood, D.H. (2016). Plant chimeras: Thegood,thebad,andthe ‘Bizzaria’. *Developmental Biology*, *419*, 41-53.

Frello, S. Venerus E., Serek, M. (2002). Regeneration of various species of Crassulaceae, with special reference to Kalanchoe. *Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 77*, 204-208.

García-Hernández, E., Loera-Quezada, M.M., Morán-Velázquez, D.C., López, M.G., Chable-Vega, M.A, Santillán-Fernández, A., Zavaleta-Mancera, H.A., Tang, J.Z., Azadi, P., Ibarra-Laclette, E., Alatorre-Cobos, F. (2022). Indirect organogenesis for high frequency shoot regeneration of two cultivars of *Sansevieria trifasciata* Prain differing in fiber production. *Scientific Report, 12*, 8507.

Henley, R.W., Chase, A.R., Osborne. L.S. *Sansevieria* Production Guide.CFREC-A Foliage Plant Note RH-91-30. University of Florida, USA.


[ Downloaded from flowerjournal.org on 2026-11-18 ]

[ DOI: 10.61186/flowerjournal.7.2.261 ]

Ioannou, M., Ioannou, N. (1992). Micropropagation of *Kalanchoe Blossfeldiana* Poelln., from leaf-blade segments. Miscellaneous Reports Agricultural Research Institute, *Ministry of Agriculture and Natural Resources Nicosia*, *53*, 4.

Kakoui, F., Salehi, H. (2011). The effect of different pot mixes on growth and development of *Spathiphyllum wallisii*. 7th Congress of Iranian Horticultural Science, Esfahan, Iran.

Kaur, J., Mudgal, G. (2021). An efficient and quick protocol for *in vitro* multiplication of snake plant, *Sansevieria trifasciata* var. Laurentii. *Plant Cell Tissue and Organ Culture, 147*, 405–411. https://doi.org/10.1007/s11240-021-02132-0.

Murashige, T., Skoog, F. (1962). A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures. *Physiologiae Plantarum, 15*, 473–497.

Nazari, F., Farahmand, H., Ghasemi Ghehsareh, M. (2014). The effects of different amounts of natural zeolite on vegetative and reproductive characteristics of *Narcissus tazetta* L. cv. Shahla. *Journal of Plant Production, 37*, 39-48.

Paek, K.Y., Hahn, E.J. (1999). Variations in African violet `Crimson Frost' micropropagated by homogenized leaf tissue culture. *HortTechnology, 9*. https://doi.org/10.21273/HORTTECH.9.4.625.

Samiei, L., Khalighi A, Kafi M and Samavat S. (2005). Peat moss substituting with some organic wastes in pothos (*Epipremnum aureum* 'Golden pothos') growing media. *Journal of Horticulture Technology and Science, 6*(2), 79 - 88.

Sarmast, M.K., Salehi, M., Salehi, H. (2009). The potential of different parts of *Sansevieria trifasciata* L. leaf for meristemoids production. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 3*(3), 2506-2509.

Shahzadm, A., Ahmasd, N., Rather, M.A., Husain, M.K., Anis, M. (2009). Improved shoot regeneration system through leaf derived callus and nodule culture of *Sansevieria cylindrical*. *Biologia Plantarum, 53*, 745-749.

Torres, K.C. (1989). *In Vitro* Propagation of Snake Plant (*Sansevieria*). In: Tissue Culture Techniques for Horticultural Crops. Van Nostrand Reinhold.

Veltcheva, M.R., Svetleva, D.L. (2005). *In vitro* regeneration of *Phaseolus vulgaris* L. via organogenesis from petiole ex-plants. *Journal of Central European Agriculture, 6*(1), 53-58.

Wahyuningsih, T. (2006). Pengaruh beberapa konsentrasi benziladenin (BA) atau kinetin pada pembentukan tunas adventif *Sansevieria trifasciata* Lorentii *in vitro*. Skripsi Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. pp.26.

[ Downloaded from flowerjournal.org on 2026-11-18 ]

[ DOI: 10.61186/flowerjournal.7.2.261 ]

Wang, Y., Mou, H., Lü, Y., Li, H., Wang, Y., Chen, J. (2017). *In vitro* Regeneration and Industrial Micropropagation of *Haworthia retusa* × *cooperi* cv. 'Variegata'. *Chinese Bulletin of Botany*, *52*, 331-336.

Yusnita Pungkastiani, W., Hapsoro, D. (2011). In vitro organogenesis of two *Sansevieria* cultivars on different concentration of benzyladenine (BA). *Agrivita*, 147-153.

[ Downloaded from flowerjournal.org on 2026-11-18 ]

[ DOI: 10.61186/flowerjournal.7.2.261 ]

Flower and Ornamental Plants (2023), 7(2): 261-276
Research article
DOI: 10.61186/flowerjournal.7.2.261

# Appraisal of leaf cutting, soil mixture and leaf explants on production of *Sansevieria trifasciata* under *ex/in vitro* condition

**Mostafa Khoshhal Sarmast*, Matin Dolati, Maryam Abbasabad, Esmaeil Seyfi, Mehdi Alizadeh**

Department of Horticultural Science and Landscape Engineering, Faculty of Plant Production, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources (GUASNR), Gorgan
✉ mkhsarmast@gau.ac.ir
Received: 2022/06/27, Revised: 2022/08/21, Accepted: 2022/08/26

**Abstract**

Mass propagation along with preserving the true-to-type characteristics is the goal of ornamental plants clonal propagation. Among the ornamental species, chimeric plants have always been of interest because of their attractive appearance. The mother-in-law's tongue or *Sansevieria trifasciata*, due to its fleshy leaves and high tolerance to adverse environmental conditions, is very suitable as an indoor plant. Since the clonal propagation of aforesaid plants are through rhizomes and offset, therefore the aim of this study was to evaluate the type of leaf cuttings and soil mixture under greenhouse conditions and also aimed to see leaf explants response under *in vitro* condition. The results of experiments performed in the greenhouse show that the type of leaf cuttings is ineffective in inducing chimeric plants. Cocopeat-Perlite soil mixture led to the production of more roots in regenerated plants, however, compared to Perlite, it failed to improve shoot regeneration. There was no significant difference between plants regenerated from chimeric parts of reverse V shape cuttings compared to the simple leaf cuttings. *In vitro* studies using the 2,4-D and kinetin revealed that the explants which were incubated for 20 days in MS media supplemented with 0.35 mg/L 2,4-D and then kinetin resulted in a higher average number of shoots. Although the use of leaf explant was not effective in inducing true chimeric shoots, some plastidial mutations were seen, leading to the production of albino plants. *In vitro*-induced plants were acclimated with 100% efficiency in greenhouse conditions under mist system. Overall, the results of these *in/ex vitro* studies failed to induce chimeric plants likely due to the *de novo* meristemoid induction originating from inner layers of chimeric tissues.

**Keywords:** Chimeric tissue, Leaf cutting, Proliferation, *Sansevieria trifasciata*, 2,4-D.

[ Downloaded from flowerjournal.org on 2026-11-18 ]

[ DOI: 10.61186/flowerjournal.7.2.261 ]